



GFEV | GROUPE FRANÇAIS
D'ÉTUDE DES
VASCULARITES

MAINRITSEG

MAINTenance of remission with **RIT**uximab versus azathioprine for patients with newly-diagnosed or relapsing **Eosinophilic Granulomatosis** with polyangiitis.
A prospective, randomized, controlled, double-blind study.

Objectif

Comparer 2 schémas de traitement d'entretien au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite (Churg-Strauss) après rémission :


RTX (schéma MAINRITSAN) versus AZA



MAINRITSEG : Design

Critère principal
d'évaluation

Nombre cumulé de semaines où le patient reste en rémission (BVAS=0) avec prednisone ≤ 7.5 mg/j





MAINRITSEG : Critères d'inclusion

- Diagnostic de **GEPA** (Churg-Strauss) selon ACR, Chapel Hill et/ou MIRRA
- Après diagnostic ou rechute de vascularite **au cours de l'année précédente,**
- **Dans les 30-360 jours suivant l'obtention de la rémission obtenue avec un traitement conventionnel (CS +/- CYC ou RTX),**
- **Après participation ou non à l'étude REOVAS,**
- **Avec ou sans critère de sévérité,**
- **Avec une corticothérapie à dose stable depuis > 1 mois**
- Avec ou sans ANCA.

MAINRITSEG: 1^{ère} inclusion Mars 2018

40 inclus au 15 Février 2020

Prolongation des inclusions

- **Les patients peuvent être inclus en dehors de REOVAS**
 - **Les patients peuvent être inclus et randomisés dans MAINRITSEG à la visite de M12 de REOVAS :**
 - A la visite précédente = J270 de REOVAS, information
 - à M12, visite finale de REOVAS, si le patient est en rémission avec corticoïdes stable depuis 1 mois
- => randomisation et traitement par IV immédiat**

